

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT PREGNANCY TESTS:

How does a pregnancy test work?

When you are pregnant, your body produces the pregnancy hormone hCG (human Chorionic Gonadotrophin). The level of hCG doubles approximately every 24 hours in the first weeks, reaching a maximum at around 8 to 10 weeks into pregnancy. Pregnancy tests work by detecting tiny amounts of the pregnancy hormone in your urine.

When should I take a pregnancy test?

You can take a pregnancy test from the first day of a missed period. For the most accurate result, take it in the morning when your urine is most concentrated.

Can drinking too much liquid affect my result?

Yes, it's important not to drink too much liquid including water or alcohol before you take a pregnancy test. It's better to wait until you naturally need to pass urine. This way, you'll avoid diluting your level of pregnancy hormone and getting a false 'Not Pregnant' result.

My test says I'm pregnant, what should I do?

If your test says you're pregnant (positive result) contact the Women's Clinic at Mammoth Hospital (760.924.4102) or call Mono County Health Department (760.924.1830) for a consultation.

My test says I'm NOT pregnant, what should I do?

You may not be pregnant, or the level of pregnancy hormone may not yet be high enough to be detected, or you may have miscalculated the day you expect your period. If you test early (before your missed period), take a pregnancy test again when you expect your period. If your period is overdue, take a pregnancy test again in 3 days' time. If this test gives you a 'Not Pregnant' result and you still have not had your period, see your doctor or contact the Women's Clinic at Mammoth Hospital (760.924.4102).

How accurate are pregnancy tests?

When used correctly after a missed period, most pregnancy tests are over 99% accurate.

What does an invalid result mean?

It means the test didn't work properly. This can happen if instructions weren't followed or the test is damaged or expired. You should take a new test.

Can any medication or medical conditions affect the results?

Fertility drugs containing hCG can give misleading results. Ectopic pregnancy, ovarian cysts, menopause and some very rare medical conditions can also give misleading results.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS PRUEBAS DE EMBARAZO:

¿Cómo funciona una prueba de embarazo?

Cuando estás embarazada, tu cuerpo produce la hormona del embarazo hCG. El nivel de hCG se duplica aproximadamente cada 24 horas durante las primeras semanas, alcanzando su máximo entre las semanas 8 y 10 del embarazo. Las pruebas de embarazo funcionan detectando pequeñas cantidades de la hormona del embarazo en la orina.

¿Cuándo debo hacerme una prueba de embarazo?

Puedes hacerte una prueba de embarazo desde el primer día en que no te haya bajado la regla. Para obtener un resultado más preciso, hazla por la mañana, cuando la orina está más concentrada.

¿ Puede afectar mi resultado el beber demasiado líquido?

Sí, es importante no beber demasiado líquido, ni siquiera agua o alcohol, antes de hacerse una prueba de embarazo. Es mejor esperar hasta que sienta la necesidad natural de orinar. De esta forma, evitará diluir el nivel de la hormona del embarazo y obtener un resultado falso de embarazo.

Mi prueba dice que estoy embarazada, ¿qué debo hacer?

Si la prueba indica que está embarazada (resultado positivo), comuníquese con la Clínica para Mujeres del Hospital Mammoth (760.924.4102) o llame al Departamento de Salud Pública del Condado de Mono (760.924.1830) para una consulta privada.

Mi prueba dice que NO estoy embarazada, ¿qué debo hacer?

Es posible que no esté embarazada o que el nivel de la hormona del embarazo aún no sea lo suficientemente alto para detectarse, o tal vez haya calculado mal el día en que espera tener su período. Si ha realizado la prueba demasiado pronto, vuelva a repetirla cuando le tenga que venir la regla. Si se le retrasa la regla, vuelva a repetir la prueba en 3 días. Si el resultado de la prueba es negativo y sigue sin tener la regla, consulte a su médico o póngase en contacto con la Clínica de las Mujeres en el Hospital Mammoth (760.924.4102).

¿Qué nivel de precisión tienen las pruebas de embarazo?

Cuando se utilizan correctamente, la mayoría de las pruebas tienen una precisión superior al 99%.

Qué significa un resultado inválido?

Significa que la prueba no ha funcionado correctamente. Esto puede ocurrir si no se siguen las instrucciones o si la prueba está dañada o expirada. Debe realizar una nueva prueba.

¿Puede algún medicamento o condición médica afectar los resultados?

Los medicamentos para la fertilidad que contienen hCG pueden dar resultados falsos. El embarazo ectópico, los quistes ováricos, la menopausia y algunas condiciones médicas también pueden dar resultados falsos.